

# ワクチン全般に関するQ&A

2021.4

Q 1. 複数ワクチンの同時接種を実施していますか？

A 1. 当院では実施しています。特に乳児期早期は接種するワクチンの種類が多いので注射でのワクチンに経口投与のワクチンを合わせて5種類程度までを同時接種することがあります。

Q 2. 北上市以外に住んでいますが当院で予防接種は受けられますか？

A 2. 金ヶ崎町・奥州市・西和賀町の方は公費にて接種可能です。(自己負担金なし) その他の市町村にお住まいの方は居住地、予防接種担当の課へお問い合わせください。(広域接種パスポートの発行により、当院での予防接種は可能ですが、差額発生時には窓口にて料金をお支払い頂く事があります。)

Q 3. 予約をしなくても予防接種は受けられますか？

A 3. 受けられます。が、ご予約の方を優先とさせていただきますので、ご予約をお勧めします。

Q 4. ワクチン接種後、熱が出ました。受診した方が良いですか？

A 4. ご心配な場合は受診をお勧めします。

Q 5. 薬を飲んでいても接種出来ますか？

A 5. 処方された病医院に先ずはご相談下さい。また、来院の際はお薬手帳をご持参ください。

Q 6. ワクチン接種当日の入浴は出来ますか？

A 6. いつもと変わりがなければ可能です。ただし長時間の入浴は避け、接種した場所はこすらないようにしましょう。

Q 7. 風邪をひいた後、どの位間隔を空ければ良いですか？

A 7. 軽い症状で、体調が良ければワクチン接種が受けられるかもしれません。接種前に診察を行いますので心配な場合はご相談下さい。

# ロタウイルスワクチンについて

2021.4

Q1.ロタリックスとロタテック 2 種類のワクチンがありますが、どのような違いがありますか？

A1.

商品名（ワクチン構成）	ロタリックス（1 価）	ロタテック（5 価）
親ウイルス株	ヒトロタウイルス	ウシロタウイルス
1 回投与量と回数	1.5ml を 2 回	2ml を 3 回
初回接種時期	生後 6 週～14 週 6 日	生後 6 週～14 週 6 日
最終接種時期	生後 24 週までに 2 回目終了	生後 32 週までに 3 回目終了

Q2.ロタウイルスワクチンの目的と予防効果を教えてください。

A2. ロタウイルス感染による胃腸炎を予防するためのワクチンで、ワクチン接種により重症になることを約 90%防ぐことができます。効果は、少なくとも 3 年間持続することが海外の臨床試験で確認されています。お母さんからもらった免疫は出生後、数ヶ月で低下しますので早めに接種を始めましょう。

Q3.ロタウイルス胃腸炎の症状と発症頻度を教えてください。

A3. 症状は突然の嘔吐、発熱、白っぽい水様性の下痢を認め、回復には 1 週間ほどかかります。合併症としては脱水、けいれん、肝機能異常、腎不全、脳症等があります。乳幼児に多く見られる疾患で、ワクチンの開始以前は 5 歳までにほぼすべての乳幼児が感染していました。また、日本でもつい最近までは小学校に入るまでに約 2 人に 1 人がロタウイルス胃腸炎で小児科外来での治療を必要とし、さらに外来受診者の 15 人～43 人に 1 人が入院していたと推定されていますが、令和 2 年からの定期接種化により発症や重症化する例は激減すると期待されています。

Q4.ロタウイルスワクチン接種後の副反応を教えてください

A4. 接種後 2 週間程度までの副反応としては、嘔吐、下痢、発熱がみられることがあります。特に注意すべき副反応として、接種後 1 か月間（特に初回接種後 1 週間）頃までは腸重積が挙げられます。ワクチン接種後に腹痛・周期的な啼泣・原因不明な周期的不機嫌・反復性嘔吐・イチゴゼリー様の血便の排泄・腹部膨満・ぐったりして顔色不調等の症状があるときには速やかに受診してください。

# 子宮頸がんワクチンについて

2021.4

Q1：接種後の一般的な副反応、注意すべき点はありますか？

A1：局所の副反応として注射部位の痛み、腫脹、発赤を認めることがあります。

また、注射による痛みや緊張などにより血圧が下がり、気分が悪くなったり失神を起こすことがあります。迷走神経反射といわれ思春期の女性に多いという報告もあります。注射後 30 分程度は注意深く観察しながら、場合によっては立ち上がらない、移動の時は付き添ってもらい、背もたれのある椅子に座るなど十分注意して下さい。

Q2：ワクチンの効果は何年持続しますか？

A2：2 価(サーバリックス)は 4 年～9. 4 年後まで効果があると言われていました。

4 価 (ガーダシル) は 9 歳～15 歳を対象にしたもので初回接種後 8 年の効果があると言われていました。

Q3：ワクチン接種後も子宮頸がん検診は必要ですか？

A3：ワクチン接種後も 20 歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診は必要です。

Q4： 予約はしなくとも接種できますか？

A4： 準備に数日要する場合があるため電話での予約をお願いします。

Q5： 推奨年齢はいつ頃ですか？

A5： 小学校 6 年から高校 1 年生までが公費で接種可能です。10～14 歳での接種が推奨されていますが標準としては中学 1 年生です。